

✓ هرچه زاویه بین بول و محور طولی بوزن بیشتر باشد، میزان خم شدن (Deflection) بوزن درصحن عبور از بافت نرم دهان بیشتر می شود.

(Deflection)

وزن

HUB

✓ سلجخ داخل حفره های فکریها / به بیرون نوزده
و اکثر به بیرون نوزده


✓ نسبت به بول یا تزریق کننده :
علت اصلی عدم توجه تزریق کننده / ولی حرکت ناگهانی و غیر مستقیم بیرون علت آن می باشد

- ✓ موثر بول
- * most effective puncture
- * Least Trauma
- Less Tissue Displacement
- Less force to puncture
- ✓ استایل
- ✓ Inflation و PDL
- ✓ بول ها

BRIT

* Back and Forth Rotational Motion
acupuncture
[مثل طب سوزنی / استیرومنش اندو]

در شبیه ریتال موروم منبیل (PDL) (3) ریتال موروم (IO)
(2) ریتال صلفها (IP)
✓ آنه بوزن بیش از 2-4 در بافت نرم PDL یا IP دارد نمیشد - ↓ اقبال شکست



متداول تر بوزن 27	بلند نایج 27
کوتاه نایج 30	
ابده آل 27	کوتاه و بلند
تفا بوزن که باید توجه بایستد	
(انزاس)	بلند نایج 25

طول بوزن کوتاه 20 mm
طول بوزن بلند 32 mm

مطابق Mc Nall و Foldes

نایج 25	⊕ / 100
نایج 27	⊕ / 87
نایج 30	⊕ / 2

Is Recommended :

- 1 نواحی پر عروق
 - 2 خم شدن بوزن در بافت نرم
- بوزن 27 (نایج) / بوزن 30 (کوتاه) / بوزن 25 (بلند)

* آنه صفت کوچیک از بوزن (نایج منبیل)

بیرون از بافت بایستد / میانه با هویتات یا فوایس بیرون کشیدن